


時間が長く体の負担が大きくなり、術後の合併症（続発症）の頻度も高くなります。

一度で3部位 長時間に



します。

リンパ節への転移も胃がんや大腸がんよりも多いため、リンパ節の摘出も重要となります。首、胸、おなかの三つの手術を一度に行うため、手術

時間が長く、徳島大学病院食道がん手術難易度評価基準によると、この手術は「非常に困難」とされています。しかし、この手術によって多くの患者が長期生存を実現しています。

回答

食道は喉と胃をつなぐ管状の

臓器です。同じ食事の通り道である胃や大腸のがんと比べて、食道がんは治りにくい病気と考えられています。

食道はほとんど筋肉でできており、いわばゴム管を伸ばした状態になつていて、部分切除ができません。食道がんの手術では、がんの部分を含む食道と周囲のリンパ節を摘出した後に、食道の代わりを作り直す必要があります。多くは胃を代用

後藤 正和
徳島大学病院食道・
乳腺甲状腺外科
診療科長



食道がん手術難しい？



手術を安全に受けるためには、まず生活習慣の改善が必要です。喫煙者や多量飲酒者が食道がん

進行した食道がんでは、手術に先立って化学療法（抗がん剤治療）を

行なうことが一般的です。進行した食道がんでは、手術に先立って化学療法（抗がん剤治療）を行なうことがあります。禁煙・禁酒が重要になります。

がんを小さくすることによって手術の成功確率を上げる手術前に治療を行うこともあります。手術前の方が化学療法を完遂しやすいメリットもあります。手術までに時間がかかることがあります。

がん細胞を手術前に治療しておこることもできます。手術前の方が化学療法を完遂しやすいメリットもあります。手術までに時間がかかることがあります。

がん何でもクイズ

がんの発生や進行に直接的な役割を果たす遺伝子は何ですか。

- ①ドライバー遺伝子②パッセンジャー遺伝子③メンデル遺伝子

行こうよ！がん検診

がんに関する質問は
徳島がん対策センター
電話 088 (634) 6442
(平日午前 8時半から午後5時まで)