

【がん種】 悪性胸膜中皮腫

【レジメン名】 Pembrolizumab+CBDCA+PEM(MPM)

| 薬剤名      | 投与量                   | 治療スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ペムブロリズマブ | 200 mg/ body          | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ペメトレキセド  | 500 mg/m <sup>2</sup> | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン  | AUC 6                 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

備考欄

葉酸: ペメトレキセド初回投与1週間前～最終投与日から22日目まで、フォリアミン0.5mgを連日内服

ビタミンB12: ペメトレキセド初回投与1週間前～最終投与日から22日目まで、メチコバール2Aを9週毎に筋注