

【がん種】 多発性骨髄腫

【レジメン名】 Talquetamab B法

漸増期

| 薬剤名 | 投与量 | 治療スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| トアルクエタマブ | 0.01 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トアルクエタマブ | 0.06 mg/kg | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トアルクエタマブ | 0.4 mg/kg | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| トアルクエタマブ | 0.8 mg/kg | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

継続投与期

| 薬剤名 | 投与量 | 治療スケジュール | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| トアルクエタマブ | 0.8 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

備考欄

漸増期は2～4日ごとに皮下注

漸増期はデキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬を1～3時間前に内服